it

ISTRUZIONI PER L'USO

ULTRASTOP ANTIAPPANNANTE

Flacone spray da 15 ml
Flacone da 25 ml con pipetta contagocce

CARATTERISTICHE

ULTRASTOP Antiappannante è una soluzione trasparente, non colorata, che contiene una combinazione di sostanze superficialmente attive in una matrice idroalcolica (etanolo, acqua depurata, < 5% sostanze superficialmente attive).
Il dispositivo medico è disponibile in due forme commerciali:

- ULTRASTOP Antiappannante Flacone spray da 15 ml
- ULTRASTOP Antiappannante Flacone da 25 ml con pipetta contagocce

A COSA SERVE

ULTRASTOP è un prodotto antiappannamento per ottiche medicali.
Sostanze superficialmente attive in una speciale combinazione formano uno strato limpido e trasparente sulle superfici trattate. Questo film ultrasottile agisce in modo tale da impedire la formazione di goccioline e di conseguenza l'appannamento della superficie per effetto del vapore acqueo condensato.
ULTRASTOP può essere usato anche per ridurre l'appannamento di occhiali con lenti graduate od occhiali protettivi medici per uso sanitario durante visite mediche o interventi chirurgici.

CAMPI DI APPLICAZIONE

ULTRASTOP è un prodotto antiappannamento per specchietti per uso diagnostico e ottiche medicali che non devono essere trattati in modo rigorosamente asettico. La durata di applicazione solitamente è inferiore ai 60 minuti.
ULTRASTOP Antiappannante è idoneo per:

- specchietti per uso diagnostico (es. specchietti laringei ed epifaringei, specchietti odontoiatrici) e lenti per endoscopi (in particolare in otorinolaringoiatria e per la colonscopia),
- occhiali con lenti graduate e occhiali protettivi medici,
- lenti e specchi in microscopi e altre ottiche medicali.

INDICAZIONI PER L'USO

Ultrastop Antiappannante è previsto per l'uso da parte di personale medico specializzato.

- **Applicazione della soluzione**

Applicare una piccola quantità di ULTRASTOP Antiappannante direttamente o mediante una garza che non si sfilaccia, inumidita con ULTRASTOP, sulla superficie asciutta e pulita, e distribuirla omogeneamente. Lasciar agire brevemente e, dopo l'evaporazione, eventualmente strofinare con delicatezza con una garza asciutta, pulita e che non si sfilaccia.
ULTRASTOP Antiappannante non unge se applicato correttamente, tuttavia la superficie potrebbe apparire offuscata se lo strato applicato è troppo spesso. In tal caso si consiglia di pulire la superficie con acqua distillata e di eseguire nuovamente il trattamento come descritto sopra.

- **Durata dell'adesività e quantità da applicare**

La durata dell'adesività può variare molto in base alle apparecchiature impiegate, alla cavità corporea trattata, all'eventuale imbrattamento della lente. L'applicazione nel rispetto delle istruzioni d'uso sopra riportate può essere ripetuta quante volte necessario durante l'intervento o l'ispezione.

INDICAZIONI PARTICOLARI PER L'USO SICURO

- ULTRASTOP Antiappannante è idoneo per l'uso su vetro e plastica. Qualora questi materiali abbiano già uno strato di rivestimento o sussistano dubbi sulla resistenza di un certo materiale, rivolgersi al produttore o al distributore dell'oggetto da trattare.
- ULTRASTOP Antiappannante contiene alcool puro al 100% (etanolo). Conservare i flaconi aperti o le garze imbevute di ULTRASTOP lontano da fonti di calore, onde evitare che la soluzione si infiammi.
- La pipetta del set con pipetta (flacone da 25 ml con pipetta contagocce) è realizzata in gomma naturale che può scatenare una reazione allergica nelle persone sensibili.

SEGNALAZIONE DI EVENTI AVVERSI

Qualsiasi evento avverso collegato a ULTRASTOP Antiappannante deve essere segnalato al produttore (e-mail: pms@mono.co.at) e alla sua autorità competente in materia:

Ministero della Salute – Ufficio 5 - Vigilanza sugli incidenti con dispositivi medici
Via Giorgio Ribotta 5, 00144 Roma – IT, e-mail: l.lispi@sanita.it, tel: 06 5994 2055,
sito web: http://www.salute.gov.it/

INDICAZIONI PER LA CONSERVAZIONE

- Non conservare al di sopra di 25 °C.
- Proteggere dalla luce.

CONSERVABILITÀ

Se conservato correttamente, ULTRASTOP si conserva fino alla data di scadenza indicata sulla scatola pieghevole e sull'etichetta. La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno del mese indicato.

Conservabilità dopo l'apertura:
Dopo la prima apertura del flacone, la soluzione deve essere consumata entro 8 settimane.

ULTERIORI INFORMAZIONI IMPORTANTI

I simboli presenti sull'etichetta del flacone e sulla scatola pieghevole hanno il seguente significato:

	Produttore		Distribuzione
MD	Dispositivo medico	REF	Codice articolo
LOT	Denominazione del lotto		Da utilizzare entro
25	Non conservare al di sopra di 25 °C		Proteggere dalla luce
	Seguire le istruzioni per l'uso!		Attenzione: vedere "Indicazioni particolari per l'uso sicuro"

Scansionare il codice QR sulla scatola pieghevole per le istruzioni per l'uso in

bg/cs/da/de/el/en/es/et/fi/fr/hr/hu/it/lt/lv/nl/pl/pt/ro/sk/sl/sv.

Produttore: MoNo chem-pharm Produkte GmbH, Leystraße 129, 1200 Vienna – AT
e-mail: pms@mono.co.at
Distribuzione: SIGMAPHARM Arzneimittel GmbH, Leystraße 129, 1200 Vienna – AT

CE

Informazione aggiornata: ottobre 2021 USTP-0025-BP-11